

## **Erratum: Prise en charge de la fibrillation atriale en médecine d'urgence. Recommandations de la Société française de médecine d'urgence en partenariat avec la Société française de cardiologie**

**Erratum to: Management of Atrial Fibrillation in Emergency Medicine. French Society of Emergency Medicine (SFMU) Guidelines with the Contribution of the French Society of Cardiology (SFC)**

**P. Taboulet · J. Duchenne · H. Lefort · C. Zanker · P. Jabre · J.-M. Davy · J.-Y. Le Heuzey · O. Ganansia · et les membres de la commission des référentiels de la SFMU**

© SFMU et Lavoisier SAS 2017

Erratum to : Ann Fr Med Urgence DOI 10.1007/s13341-015-0554-3

La dose d'entretien du vérapamil est en  $\mu\text{g}/\text{kg}$ . Lire donc dans le Tableau 6 (Traitement ralentisseur d'une fibrillation atriale à cadence ventriculaire rapide) : Vérapamil (Isoptine<sup>®</sup>) [hors AMM] : 5 à 10 mg en i.v. sur 2 minutes, renouvelable une fois si fréquence cible non atteinte après 10 minutes. Puis, perfusion de 5  $\mu\text{g}/\text{kg}$  par minute ou 15 mg dans 250 ml de glucosé à 5 % sur 8 heures ou relais p.o. par vérapamil 120 mg